



COVID-19 : aperçu des différents types de tests

	Test PCR nasopharyngé	Test PCR salivaire	Test rapide antigénique nasopharyngé	Test rapide antigénique dans le nez	Autotest dans le nez
<i>Analyse</i>	En laboratoire	En laboratoire	En laboratoire	Sur place (pharmacie, p. ex.)	N'importe où
<i>Prélèvement</i>	Par un spécialiste	Par toute personne	Par un spécialiste	Par un spécialiste	Par toute personne
<i>Tests validés</i>	Oui	Oui	Oui	Oui (un test validé jusqu'à présent)	Pas encore
<i>Fiabilité</i>	Très élevée	Élevée	Élevée	Satisfaisante en cas de symptômes ; probablement moins sans symptômes	Satisfaisante en cas de symptômes ; probablement moins sans symptômes
<i>Application</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Personnes symptomatiques – Personnes à risque – Personnel de santé – Personnes dépistées positives via test rapide ou autotest 	Tests répétés : p. ex. <ul style="list-style-type: none"> – entreprises – écoles – EMS – associations sportives 	<ul style="list-style-type: none"> – Personnes symptomatiques – Tests répétés – Environnement personnes à risque (visiteurs EMS, p. ex.) – Besoin personnel (dépistage en pharmacie) 	<ul style="list-style-type: none"> – Besoin personnel (dépistage en pharmacie) – Tests répétés possibles si suffisamment de tests de qualité sur le marché 	<ul style="list-style-type: none"> – Besoin personnel (dépistage à la maison) – Tests répétés possibles si suffisamment de tests de qualité sur le marché
<i>Procédure en cas de test positif</i>	Isolement	Test PCR de confirmation ; isolement	Test PCR de confirmation ; isolement	Test PCR de confirmation ; isolement	Test PCR de confirmation ; isolement